

## Állandó gyorsulású megfigyelők

Motiváció: EEP szerint „gravitáció = gyorsulás”, és időben nem változó gravitációt vizsgálunk majd. Szeretnénk  $h$  gyorsuló megfigyelőt, hogy azt mondhassuk, hogy „ $h$  gyorsulása állandó”.

Ki mérje a gyorsulást? Ha egy inerciális  $m$  megfigyelő méri, akkor nem lesz ilyen  $h$ , mert  $h$  sebessége felmenne fénysebesség fölé. Ha  $h$  maga méri a saját világképében, akkor a gyorsulás mindig 0 lesz (Gyorsuló Ego Axióma miatt).

Megoldás: minden pillanatban az együttmozgó inerciális megfigyelő mérje  $h$  gyorsulását. Esetünkben ez ekvivalens lesz avval, hogy  $h$  méri az elejtett almák gyorsulását.

**Definíció.** Legyen  $h \in \text{GyOb}$  és  $e$  esemény, amiben  $h$  résztvesz, azaz  $h \in e$ .  $h$  **belső gyorsulása** az  $e$  eseményben az a gyorsulás, amit az  $e$  eseményben együttmozgó inerciális  $m$  megfigyelő mér, azaz

$$a(h)(e) := a_m(h)(\text{loc}_m(e))$$

ahol  $m \in \text{Obs}$  olyan, hogy  $\text{együtt}(m, h, e)$ .

**Megjegyzés.** A belső gyorsulás fenti definíciójában együttmozgó  $m$  megfigyelő helyett vehetünk tetszőleges érintő  $m$  megfigyelőt (**Specrel** miatt). Tehát csak  $h$  életútja számít ebben a definícióban, világképe nem.


**Tétel**( **állandó belső gyorsulású görbék jellemzése** ) Legyen  $m \in \text{Obs}$  és  $\text{ut}_m(h) : R \rightarrow R$  állandó, nemnulla belső gyorsulású megfigyelő életútja. Akkor  $\text{ut}_m(h)$  egy Minkowski kör időszerű ága, azaz van  $p, r > 0$ , és  $s \in \{1, -1\}$ , hogy

$$\text{ut}_m(h) = \{q : M(q, p) = r \text{ és } q_x - p_x = (-1)^s * |q_x - p_x|\}.$$


**Bizonyítás:** A következő Lemma 1 - Lemma 4 -ből.  
**QED**

**Lemma 1.** Minkowski körök időszerű ágai állandó belső gyorsulású életutak.

Bizonyítás:




$m'$  lakjon az origót  $q$ -val összekötő egyenesnek a fényegyenesre vett szimmetrikus képén. Akkor  $m'$  világképe ilyen:




$m''$  a  $q$ -ban  $h$ -t érintő megfigyelő. Ő pontosan ugyanakkora a görbének látja  $h$ -t mint  $m$  (eltolva). Tehát  $m''$  ugyanakkora gyorsulásúnak méri  $h$ -t  $q$ -ban mint  $m$  a  $p$ -ben. QED

Láttuk: Minkowski-kör érintője Minkowski-merőleges a sugárra.



**Lemma 2.** Fele sugarú Minkowski kör gyorsulása kétszeres ( $r$ -szeres sugarú Minkowski-kör gyorsulása  $1/r$ -szeres).

Bizonyítás:




$$\begin{aligned}
 a(h)_0 &= \lim_{\varepsilon} \frac{v_h(\varepsilon)}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon} \frac{v_k(2\varepsilon)}{\varepsilon} = \\
 &= 2 \cdot \lim_{\varepsilon} \frac{v_k(2\varepsilon)}{2\varepsilon} = 2 \cdot a(k)_0.
 \end{aligned}$$

QED

**Lemma 3.** Minkowski körön az összes  $-1$  és  $1$  közötti sebesség előfordul.


Bizonyítás:



Válasszunk egy  $v$  sebességet. Ahol a rá Minkowski merőleges sugár metszi  $h$ -t, ott az érintő sebessége  $v$ . QED

Következmény: Legyen  $p$ ,  $v$  és pozitív  $a$  adott. Van a  $p$  ponton áthaladó  $a$  gyorsulású Minkowski kör, melynek sebessége a  $p$  pontban  $v$ .

Bizonyítás:



Vegyünk egy tetszőleges  $a$  gyorsulású Minkowski kört, és ezen vegyünk egy pontot, ahol a sebesség  $v$ . Ilyen pont van Lemma 2,3 miatt. Toljuk el a Minkowski kört úgy, hogy ez a pont  $p$ -be kerüljön. QED

**Lemma 4.** (Meghatározottság lemma) Egy pontbeli sebesség és az állandó belső gyorsulás mértéke meghatározza a gyorsuló megfigyelő életútját.

Azaz, legyen  $m \in \text{Obs}$ ,  $h, k \in \text{GyOb}$ . Tegyük fel, hogy

$$\text{ut}_m(h), \text{ut}_m(k) : R \rightarrow R,$$

$$\text{ut}_m(h)(t_0) = \text{ut}_m(k)(t_0), v_m(h)(t_0) = v_m(k)(t_0) \text{ valamely } t_0 \in R \text{ időpontra és}$$

$$a(h)(\text{es}_m(\text{ut}_m(h)(t))) = a(k)(\text{es}_m(\text{ut}_m(k)(t))) \text{ minden } t \in R \text{ időpontra.}$$

$$\text{Akkor } \text{ut}_m(h) = \text{ut}_m(k).$$

**Bizonyítás:** Házi Feladat.